

Scalibor® Protectorband ad us. vet.: Antiparasitikum für Hunde gegen Floh- und Zeckenbefall, zur Leishmaniose-Prävention und zur Verhinderung von Stichen durch Culexmücken (Moskitos).

Wirkstoff: Deltamethrin. **Indikationen:** zur Verhinderung von Infestationen mit Flöhen (*Ctenocephalides felis*) während 4 Monaten und Zecken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) während 6 Monaten; zur Verhinderung des Blutsaugens durch Schmetterlingsmücken = *Phlebotomus perniciosus* (Schmetterlingsmücken übertragen beim Blutsaugen die Erreger der Leishmaniose) während 5 – 6 Monaten; zur Verhinderung von Stichen durch Culexmücken = *Culex pipiens pipiens* während 6 Monaten. **Dosierung / Anwendung:** Zur äusserlichen Anwendung. Ein Halsband pro Hund. Das Halsband kann ab einem Alter von 7 Wochen eingesetzt werden. Zwischen Halsband und Hals sollte zwei Finger breit Platz verbleiben. Das Halsband entfaltet volle Wirkung nach einer Woche. Scalibor® Protectorband kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden. **Kontraindikationen:** Nicht bei Hundewelpen unter 7 Wochen, bei Hunden mit ausgedehnten Hautläsionen oder mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Pyrethroiden anwenden. **Nicht bei Katzen anwenden.** Deltamethrin ist ausserordentlich toxisch für Katzen. Scalibor® darf auf keinen Fall bei Katzen angewendet werden. Lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen wie starke Muskelkrämpfe und Bewegungsstörungen können die Folge sein, die zum Tod der Katze führen können. **Unerwünschte Wirkungen:** In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen zu lokalen Hautveränderungen und Haarausfall führen. Äusserst selten können neurologische Symptome wie Zittern und Teilnahmslosigkeit auftreten. In solchen Fällen sollte das Halsband entfernt werden. Die Symptome klingen danach innerhalb von 48 Stunden ab. Bei andauernden Symptomen soll ein Tierarzt aufgesucht werden. Eine symptomatische Behandlung kann mit Diazepam durchgeführt werden. **Wechselwirkungen:** Nicht zusammen mit anderen Ektoparasitika, die Organophosphate enthalten, anwenden. **Abgabekategorie:** D. **Zulassungsinhaberin:** MSD Animal Health GmbH, Luzern. **Zusätzliche Informationen:** Siehe Packungsbeilage oder www.tierarzneimittel.ch

Scalibor® Protectorband: Collier antiparasitaire pour chiens contre les puces et les tiques ainsi que pour prévenir la leishmaniose et éviter les piqûres de moustiques de l'espèce Culex. **Principes actifs:** Deltaméthrine. **Indications:** prévention des infestations de puces (*Ctenocephalides felis*) pendant 4 mois et de tiques (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) pendant 6 mois; prévention des piqûres de phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) pendant 5-6 mois (les phlébotomes étant les vecteurs de la leishmaniose); prévention des piqûres de moustiques (*Culex pipiens pipiens*) pendant 6 mois. **Posologie / mode d'emploi:** pour usage externe. Un collier par chien. Le collier peut être utilisé dès l'âge de 7 semaines. Ajuster au cou de l'animal en laissant juste deux doigts entre le collier et le cou de l'animal. Scalibor® Protectorband peut être utilisé chez les chiennes en gestation ou en lactation. **Contre-indications:** Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines, chez les chiens atteints de lésions cutanées étendues, ni chez les chiens qui présentent une hypersensibilité connue aux pyréthroïdes. **Ne pas utiliser chez les chats.** La deltaméthrine est extrêmement toxique pour les chats. Scalibor® ne doit en aucun cas être utilisé pour les chats. Des intoxications sévères peuvent en être la conséquence, caractérisées par des convulsions et des troubles locomoteurs pouvant se solder par la mort du chat. **Effets indésirables:** Dans des cas rares, une hypersensibilité peut provoquer une réaction cutanée locale et une chute des poils. Exceptionnellement, des symptômes neurologiques tels que tremblements ou absences peuvent survenir. Dans ces cas, il faut enlever le collier. Les symptômes disparaissent alors dans les 48 heures. Si les symptômes persistent, consultez un vétérinaire. Dans de tels cas, il est recommandé d'instaurer un traitement symptomatique au Diazepam. **Interactions:** Ne pas utiliser simultanément avec d'autres antiparasitaires externes contenant des organophosphorés. **Catégorie de vente:** D. **Titulaire de l'autorisation:** MSD Animal Health SARL, Lucerne. **Informations complémentaires:** Voir notice d'emballage ou sous www.tierarzneimittel.ch